



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЭКОФУЦИН®

Торговое название препарата: Экофуцин®

Действующее вещество (МНН): натамицин

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

Состав

1 суппозиторий содержит:

активное вещество: натамицин (в пересчете на 100% вещество) – 100 мг;

вспомогательные вещества: лактулоза – 300 мг, макрогола глицерилгидроксистеарат – 200 мг, кремния диоксид коллоидный – 20 мг, жир твердый – до 2300 мг.

Описание:

Суппозитории торпедовидной формы от почти белого до светло-коричневого цвета. Допускаются вкрапления белого цвета. Допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: Мочеполовая система и половые гормоны. Противомикробные препараты и антисептики применяемые в гинекологии. Антибиотики. Натамицин.

Код АТХ: G01AA02

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противогрибковый полиеновый антибиотик из группы макролидов, имеющий широкий спектр действия. Оказывает фунгицидное действие. Натамицин связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. К натамицину чувствительны большинство патогенных дрожжеподобных грибов (особенно *Candida albicans*), дрожжей (*Torulopsis* и *Rhodotorula*), а также других патогенных грибов (*Aspergillus*, *Penicillium*). Менее чувствительны к натамицину дерматофиты (*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*). Не влияет *in vitro* на грамположительные и грамотрицательные бактерии.

Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается.

Фармакокинетика

Экофуцин® не оказывает системного действия, так как практически не всасывается с поверхности слизистых оболочек.

Показания к применению

Вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные главным образом грибами рода *Candida*.

Способ применения и дозы

При кандидозных вагинитах, вульвитах, вульвовагинитах: интравагинально по одному суппозиторию в течение 3–6 дней.

Суппозитории, предварительно освободив от контурной упаковки, вводят во влагалище, находясь в положении лежа, как можно глубже 1 раз в сутки на ночь.

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней. Во время менструации применение суппозитория прерывают.

При упорном течении вагинитов, вызванных *Candida albicans*, дополнительно назначают натамицин в виде таблеток для приема внутрь: по 1 таблетке 4 раза в день в течение 10–20 дней для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике.

Побочные действия

При местном применении возможно легкое раздражение и ощущение жжения в месте введения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детям до 15 лет.

Лекарственные взаимодействия

Лекарственное взаимодействие препарата Экофуцин® с другими лекарственными препаратами не описано.

Особые указания

При вагинальной аппликации под действием температуры тела суппозитории превращаются в пенистую массу, что способствует равномерному распределению натамицина по слизистой оболочке влагалища.

В период лечения нет необходимости в исключении половых контактов, однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и, в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения натамицином. В период лечения следует использовать барьерные методы контрацепции.

Применение при беременности и период лактации

Возможно применение препарата Экофуцин® у беременных и в период лактации.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Применение препарата Экофуцин® не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Экофуцин® не сообщалось.

Форма выпуска

По 3 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

АО «АВБА РУС», Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 53А.
Тел.: +7 (8332) 25-12-29; +7 (495) 956-75-54

**Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано
регистрационное удостоверение**

АВБА Фармасьютикалс Лтд.

23А Спиру Киприану, 4001 Меса Гейтония, Лимассол, Кипр.

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по
качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан**

ООО «LEKARSTVENNAYA BEZOPASNOST»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Олимлар,
дом 43

Тел.: +998 90 928 29-99

E-mail: adversereaction@drugsafety.ru